

Objawy niepożądane związane z radioterapią w obszarze klatki piersiowej (rak płuca, przełyku i inne)

W czasie radioterapii i zaraz po (do 3 miesięcy):

Często :

- zaczerwienienie i złuszczenie skóry w miejscu napromienianym
- uczucie suchości skóry, swędzenie
- utrata włosów w obszarze napromienianym
- kaszel (zazwyczaj suchy, męczący, czasami z odksztuszeniem wydzieliny podbarwionej krwią)
- ból w klatce piersiowej
- ból przy przełykaniu, czasem wymagający zmiany diety
- uczucie suchości w gardle i przełyku
- chrypka
- nudności
- ogólne osłabienie
- męczliwość

Rzadko :

- duszność
- problemy z połykaniem wymagające założenia sondy żołądkowej do odżywiania

W dłuższym czasie po zakończeniu radioterapii (powyżej 3 miesięcy):

Często :

- przebarwienie skóry w miejscu napromienianym
- suchy kaszel
- męczliwość
- gorsza tolerancja wysiłku

Rzadko :

- utrzymujące się trudności w połykaniu
- zapalenie płuc
- zwłóknienie płuc
- zmiany w EKG
- zaburzenia kurczliwości mięśnia serca
- zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego
- martwica lub złamania żeber i obojczyka