

## **Objawy niepożądane związane z radioterapią zastosowaną po usunięciu piersi i po leczeniu oszczędzającym pierś.**

W czasie radioterapii i zaraz po (do 2-3 miesięcy):

Często:

- zaczerwienienie skóry w miejscu napromienianym
- uczucie suchości skóry, swędzenie, pieczenie
- złuszczenie skóry
- uczucie obrzęku piersi napromienianej
- klucie lub ból piersi napromienianej
- obrzęk ręki po stronie napromienianej
- utrata włosów w obszarze napromienianym
- uczucie suchości w gardle i przełyku
- ból przy przełykaniu
- ogólne osłabienie
- męczliwość

Rzadko :

- suchy kaszel
- nudności, bardzo rzadko wymioty
- ból przy przełykaniu

W dłuższym czasie po zakończeniu radioterapii (powyżej 3 miesięcy):

Często :

- przebarwienie skóry w miejscu napromienianym
- uwidocznienie naczyń krwionośnych na skórze
- uczucie suchości skóry
- zwłóknienie (stwardnienie i zmniejszenie) piersi napromienianej
- męczliwość

Rzadko :

- zapalenie płuc
- zwłóknienie płuc
- utrzymująca się duszność, głównie związana z wysiłkiem
- zmiany w EKG
- zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego
- martwica lub złamanie żeber i obojczyka
- utrzymujący się obrzęk ręki po stronie napromienianej
- bóle szyi i barku po stronie napromienianej