



Przygotowanie pacjenta do pobrania kału do badania (informacja dla pacjenta)

Kał na badanie parazytologiczne i analityczne należy pobrać w plastikowy pojemnik z łopatką w środku

- 1) **badanie parazytologiczne** – pobrać świeży kał, jak na badanie analityczne; jeśli w stolcu widoczne są pasożyty należy oddzielić je od próbki kału, wypłukać wodą i przesłać w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość wody.
- 2) **badanie analityczne** (badanie ogólne) – pobrać kał z miejsc zawierających krew, śluz lub ropę
pojemnik przeznaczony na kał należy podpisać imieniem i nazwiskiem,
pobrać świeży kał przy pomocy łopatki umieszczonej w pojemniku, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha laskowego (z 2-3 różnych miejsc),
pojemnik szczelnie zamknąć, zabezpieczyć woreczkiem foliowym,
kał należy w możliwie krótkim czasie dostarczyć do laboratorium, w przypadku dłuższego przechowywania powinien znajdować się w lodówce.
- 3) **Badanie w kierunku obecności jaj owsika** – wymaz okołoodbytniczy – metoda przylepca celofanowego
do wykonania badania używa się przezroczystego przylepca celofanowego. Pasek przylepca długości 5-7 cm i szerokości 2 cm przykładą się lepką stroną do fałd odbytu, delikatnie przyciskając do całej szerokości, następnie tą samą stroną przykleja się na szkiełku podstawowym. Wymaz należy wykonać po 2 godz. od zaśnięcia lub rano po przebudzeniu.