

USG jamy brzusznej

1. Na badanie zgłosić się na czczo (w dniu badania nie jeść, nie pić, nie palić papierosów, jeśli to możliwe nie zażywać leków)
2. W dniu poprzedzającym badanie unikać pokarmów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów jelitowych, takich jak: napoje gazowane, jabłka, bita śmietana, świeże pieczywo.

Przyjąć np. Espumisan 3x2 kapsułki po jedzeniu, dodatkowo 2 kapsułki rano w dniu badania.

USG gruczołu krokowego (prostaty), pęcherza moczowego i miednicy malej

1. Nie jeść co najmniej 4 – 5 godzin przed badaniem
2. Przed badaniem należy wypić około 1 litra napoju niegazowanego i zgłosić się z wypełnionym pęcherzem.

USG (jamy brzusznej, prostaty, pęcherza moczowego, miednicy malej, piersi i inne)

Należy przynieść ze sobą wyniki poprzednich badań (na USG piersi również zdj. z mammografii)

Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej

20.06.2025

/podpis na oryginale/